

照顾 你的狗



人类和狗共同生活已超过一万年。养狗可作为友伴，负责护卫及牧放，而狗也是视听有困难或身体有残障人士的好帮手。

WSPA

World Society for the Protection of Animals

怎样照顾你的狗

为保持健康与快乐，狗需要

- 均衡的食物
- 运动
- 兽医护理
- 友伴



狗的住处

- 住在屋外的狗，需要一个庇护处来防御炎热和寒冷气候。
- 狗需要舒服的睡床。
- 如果有需要将狗用绳系住，应用长且滑动的绳（见图）。固定的链或绳，会使到狗受绑部位受伤。

食物和水

- 狗需要蛋白质及纤维均衡的食物。家庭的残剩食物不足以维持良好体重或强健的肌肉。
- 尖的骨头有危险，因为可能哽住狗的喉部，或造成其他问题，如果将之吞下。
- 应当用清洁的碗，每天供应新鲜的水。



运动

- 不可长期将狗绑住，它需要时常运动。
- 每天散步和用棒或球作游戏，能使狗保持机警，活跃及化解烦躁。
- 烦躁的狗可能太会吠而干扰邻居。

卫生

- 住在脏处的狗，可能感染虫害或虱子。
- 狗及它生活的地方必须保持清洁。



预防注射

- 狗很容易染上多种危险疾病，且疗费昂贵。
- 预防注射可防病及减少感染其他狗之风险。



刷拭

- 时常刷拭狗可保持狗的清洁，且有机会觉察它身上是否有寄生物。
- 刷拭可使狗儿习惯于抚弄。

繁殖

- 每年有成千上万只狗被毁，因为没有为它们提供足够的住处。
- 母狗每年可生产许多小狗。在六年内，一对狗及它们的后代，能生出 67,000 只小狗。
- 经常生产及护养小狗，对母狗健康有不良影响。
- 有孕及授乳的母狗，需要额外食物。
- 母狗有保护小狗之天性，而这个时期会很凶。应为母狗提供安静之处。
- 防止不需要之狗儿，应让兽医为你的狗动绝育手术。



绝育手术

- 现代的兽医设备及药物，使手术安全，无痛及很快复原。
- 请教你的兽医何时为你的狗动阉割手术。
- 母狗不必在临产前才动手术。
- 狗儿到有八周大就动手术，现在已被认为是一项积极的做法。
- 动过手术之雌狗，就不再有发春期，雄狗也不会再来找它。
- 动过手术之雌母狗能减少患乳腺肿瘤之风险。
- 动过手术之雄狗，可减低凶性及到处游荡。



向兽医求教

请记住，兽医能对下列各项给予忠告：

- 食物
- 训练宠物
- 医治寄生虫
- 预防注射
- 绝育手术
- 任何其他健康问题



WSPA 是一个国际性组织，在七十六个国家展开活动，有超过三百五十个成员协会。WSPA 在联合国（UN）及欧洲议会（CoE）有其代表，并配合世界卫生组织（WHO）及欧洲伙伴动物兽医联合会（FECVA）共同工作。



WE BELIEVE
Consultative Status with the
Economic-Social Council

WSPA

World Society for the Protection of Animals

89 Albert Embankment, London, SE1 7TP, UK.

Tel: +44 (0)20 7793 0540 Fax: +44 (0)20 7793 0208

e-mail: petrespect@wspa.org.uk www.wspa.org.uk

当地联络处